

Au jardin



Actifs d'origine naturelle
Prévenir les maladies
Traiter · Soigner
Fertiliser - Stimuler

Éloigner ou éliminer
les insectes et les rongeurs
Des solutions parmi les plus
sûres
et les plus efficaces

Dans la maison



SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay

Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr

Piège à phéromones Charançon rouge du palmier

**Capture les charançons
mâles et femelles**



DOUBLE ACTION

Piège les mâles
et les femelles



ÉCOLOGIQUE

Sans insecticide



RÉUTILISABLE

Plastique 100 %
recyclable



GRANDE EFFICACITÉ

Traite jusqu'à 50 m²
(130 m³)



**À utiliser avec
une phéromone**



Le **charançon rouge du palmier** (*Rhynchophorus ferrugineus*) est un coléoptère particulièrement destructeur pour les palmiers. Les femelles pondent leurs œufs dans les tissus du palmier. Après éclosion, les larves pénètrent dans les tissus végétaux et creusent des galeries en se nourrissant. Leur activité peut provoquer un affaiblissement du palmier, le jaunissement et le dessèchement des palmes, la dégradation du cœur et, dans les cas les plus graves, la mort de l'arbre. Les infestations peuvent rester difficiles à détecter à leurs débuts, car les larves se développent à l'intérieur du palmier.

Composition du piège

1

CHAPEAU VERT

Support destiné à recevoir le diffuseur de phéromone.

2

CORPS PYRAMIDAL NOIR

Structure robuste permettant aux charançons de se déplacer sur le piège.

3

BOL COLLECTEUR BLANC

Récipient situé à la base du piège, destiné à recueillir les charançons capturés.



Comment identifier le problème ?

Dommages aux palmes : Les premiers signes d'infestation par le charançon rouge du palmier (*Rhynchophorus ferrugineus*) peuvent être difficiles à détecter. Les larves se nourrissent des tissus internes du palmier et creusent des galeries qui perturbent sa croissance. Les palmes peuvent jaunir, se dessécher, s'affaïsser ou présenter des découpes anormales. Dans les cas avancés, la couronne devient asymétrique et le cœur du palmier peut être entièrement détruit, entraînant sa mort.

Présence de larves : Les larves du charançon rouge sont de gros vers blanchâtres à jaunâtres, dépourvus de pattes, avec une tête brun-orangé. Elles peuvent atteindre environ 5 cm de longueur. Elles vivent dissimulées à l'intérieur du palmier, principalement à la base des palmes et dans les tissus tendres du stipe. En creusant leurs galeries, elles provoquent d'importants dégâts internes, souvent invisibles depuis l'extérieur.

Présence de fibres et de déjections : L'activité des larves peut entraîner l'apparition de fibres végétales déchiquetées, de sciure humide et de déjections brunâtres au niveau des bases des palmes ou des ouvertures dans le stipe. Un écoulement brunâtre, parfois accompagné d'une odeur de fermentation, peut également être observé. Ces indices permettent de suspecter la présence de larves à l'intérieur du palmier.

Présence de charançons adultes : Les adultes sont de gros coléoptères mesurant généralement entre 2 et 4 cm, de couleur rouge-orangé à brun-rouge, avec des taches noires sur le thorax et un long rostre caractéristique. Ils sont capables de voler sur plusieurs kilomètres pour rechercher de nouveaux palmiers. Les femelles pondent leurs œufs dans les tissus tendres ou les blessures du palmier. Après éclosion, les larves pénètrent dans les tissus et commencent à creuser leurs galeries.

Accessoires pour l'utilisation du piège

Attention il est obligatoire de placer la phéromone dans un piège de type PalmaTrap

Attention : le piège est vendu seul / La phéromone est vendue séparément ou dans le kit piège + phéromones

Période de piégeage du charançon rouge du palmier

Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Jui	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec

Utiliser les phéromones pour surveiller et capturer les charançons


Les phéromones d'agrégation reproduisent les signaux chimiques utilisés par les charançons rouges pour se regrouper. Placées dans un piège adapté, elles attirent les adultes mâles et femelles vers le dispositif de capture.

Attention : Le piégeage par phéromones constitue une méthode de surveillance et de capture complémentaire. Il ne détruit pas les œufs ni les larves déjà présents à l'intérieur du palmier. En cas d'infestation, un traitement adapté doit également être envisagé.

La phéromone (vendue séparément) est à remplacer tous les 90 jours (3 mois environ). Elle doit être conservée au réfrigérateur avant son utilisation et peut être conservée dans un congélateur sur des durées plus longues.

Mode d'emploi du piège Water Trap à utiliser avec une phéromone (vendue séparément)

1




Ouvrir le sachet aluminium contenant le diffuseur de phéromone. Sans l'ouvrir, placer le diffuseur au centre du chapeau vert avec des gants.

2



Fixer le chapeau vert sur le corps pyramidal noir (clips faciles).

3



Placer dans le bol collecteur blanc des débris de palmiers et éventuellement une pierre afin d'assurer la stabilité du piège dans les régions ventées.

Fixer le bol collecteur blanc à la pyramide grâce aux 2 ergots du bol collecteur.

Ne pas placer les pièges trop près des palmiers. Respecter une distance minimale de 20 m avec le palmier le plus proche (dans la mesure du possible). Placer les pièges en périphérie de la zone plantée de palmiers, avec une distance minimale de 50 m entre chaque piège.

Niveau faible (palmiers infestés à plus de 10 km) : 2 pièges/ha pour les grandes surfaces et 1 à 2 pièges/ha pour les petites surfaces.

Niveau élevé (palmiers infestés à proximité) : 4 à 6 pièges/ha pour les grandes surfaces et 2 à 6 pièges/ha pour les petites surfaces.